

Telefon:

SWEREF 99 N: 6139954 E: 382535

Led	Behandling	Dos l/ha	Behandlingstidpunkt	Beställare
A.	Obehandlat	-		Svensk Raps
B.	Cantus	0,25 l	Höst 4-8 blad	BASF
C.	Cantus	0,50 l	Höst 4-8 blad	BASF

Behandling vid 4-8 blad vid god tillväxt och före första nattfrosten.

Rutfördelning i fält

Villor

Markering

A	B	C
10		12
A	B	C
7		9
C	A	B
4		6
B	C	A
1		3

OS7-
23
MC 807/108

Försöket ligger ca 500m i SO riktning från Egonsborg Norrpil ↓ Plöjningsriktning ↔

Bruttoyta 12 x 3 = 36 m²

Skördeyta 8,70 x 1,95 = 17 m²

Sort: Catalina Sådatum: 2/8-08

Förfrukt år 08: 07: 06:
Vårkorn S-betor H-vete

Jordprov datum:

Gödsling	Medel	Mängd/ha	Datum
NPk	17-6-14	250	2/8

Bekämpn. ogräs	Medel	Mängd/ha	Datum
Butisan Top	1,75	30/8	

Bekämpn. insekt	Medel	Mängd/ha	Datum
Fastac	0,3	11/9	

Besprutning enl plan, datum och DC
13/10 16-18

Skörd [Y.KG] Datum

Allmänna uppgifter/anvisningar

Planttäthet höst % (PL.SF) Rutvis
Planttäthet vår % (PL.SS) Rutvis
Tillväxtpunktens höjd höst cm (H) Rutvis

Fösket skall behandlas mot bomullsmögel, se PM

Angrepp av torröta (Phoma) graderas vid ett tillfälle några dagar före skörd, tidigast i DC 90.

Torröta (Phoma) % [LEPTMA] Rutvis

Skilj rutorna senast 2 veckor före skörd

Mognadsgradering som i sortförsöken [DDR]

Torkskada % [DAD] Rutvis

Grönskott vid skörd % [SH.GN] Rutvis

Stjälkstyrka vid skörd % [STS.SH] Rutvis

Vid skörd, rutvisa prov för analys skickas till Cereallaboratoriet i Svalöv

Kopia av fältdata till Lennart Pålsson, SLU

Kontaktperson:
Albin Gunnarson 070-5686027

Utföraransvarig:
Göran Töllmar 0411-532260
0708-161060