

Losta och örtogräs i höstvetete L5-2426, vår

Allmänt om försöken

Tre försök genomfördes i Skåne. Ett av försöken skördades inte på grund av torkskador.

Ogräseffekt och skörd

Ingen försöksmässig bekämpning utfördes på hösten. Den första bekämpningen på våren utfördes mellan den 7 och 16 april. Behandling två utfördes mellan den 17 och 28 april. Första behandlingen utfördes försent beroende på försenad försöksbeställning.

Behandlingarna har gett upphov till höga, inte signifikanta skördeökningar på mellan 1 330 och 1 600 kg/ha.
Högst skördeökning och bäst ogräseffekt blev det efter en dubbelbehandling på våren med 12,5 g Monitor + 0,5 l vätnedel (tabell 4). Skillnaden är dock inte statistiskt säker till en dubbelbehandling med Broadway.
Ogräsfloran dominerades av sandlost, snärjmåra och trampört samt mindre mängder baldersbrå, vallmo och åkerbinda.

Tabell 4. L5-2426. Bekämpning av losta och örtogräs. Skörd och ogräseffekt åtta veckor efter sista bekämpning. Medeltal tre försök 2014. Värden följda av samma bokstäver är inte skilda åt

Försöksled	Skörd kg/ha	Skörd Relativtal	Effekt sandlost 8 veckor	Effekt S:a Örtogräs 8 veckor	Marktäckning % ogräs skörd
1. Obehandlat, skörd kg/ha, täckning % ogräs	7330	100	39	18	34
2. 110 g Broadway + 0,5 l PG26N 1)	8790	120	37bc	98	5
"3. 110 g Broadway+0,5 l PG26N 1) och 110 g Broadway+0,5 l PG26N 2) "	8930	122	64ac	99	3
"4. 12,5 g Monitor+ 0,5 l vtm. 1) och 12,5 g Monitor + 0,5 l vtm.2) Mätare"	8790	120	80a	98	2
5. (60 + 120) g Attribut Twin + 0,5 l Mero 1)	8660	118	29b	96	6
Antal försök:	2	2	3	2	2

1) Vår, tillväxtens början (grödan) 2) ca 10-12 dagar senare än tidpunkt 1



Sandlost kan vara ett allvarligt ogräs i höstvetetäta växtföljder med reducerad jordbearbetning.