

År 1998 och 1999 var det höstvete i hela försöket

Led	År	Gröda	År	Gröda	År	Gröda	År
A	2000	Höstvete+insådd*	2001	Träda m insådd	2002	Vårvete	2003 Höstvete
B	2000	Höstvete	2001	Träda, stubb	2002	Vårvete	2003 Höstvete
C	2000	Höstvete	2001	Höstvete	2002	Vårvete	2003 Höstvete
D	2000	Höstvete	2001	Havre	2002	Vårvete	2003 Höstvete
E	2000	Höstvete	2001	Ärter	2002	Vårvete	2003 Höstvete

*Insådd av fånggröda 15 kg/ha, 30% rödklöver (4,5 kg) 70% ängssvingel (10,5 kg)

Rutfördelning i fält

ABCDE BADEC DECBA EDCAB

Försöket ligger ca 100 m i S riktning från Toftakulla

Norrpil Plöjn.riktn. $\longleftrightarrow$

Allmänna uppgifter/anvisningar

Bruttoruta 4,0 m x 12,0 = 48,0 m²

Sort:

Mängd:

Sådatum:

PK dat:

Medel, mängd:

Kväve, dat:

Medel, mängd:

Ogräsbek dat:

Medel, dos:

Svampbek dat:

Medel, dos:

Insektsbek dat:

Medel, dos:

Skifte nr

Skörderuta x = m²

Iakttagelser:

Planttäthet vår efter förförfrukt

Träda med insådd dat 0-100

Träda, stubb dat 0-100

Höstvete dat 0-100

Havre dat 0-100

Ärter dat 0-100

Skörd: dat

Skörd: skördeprov AnalyCen ledvis

400 27-4
03-03-27