

# Aktuella ogräsförsök i spannmål och majs

## SAMMANFATTNING OCH SLUTORD

De viktigaste resultaten av sammanlagt tolv försök i spannmål och tre i majs sammanfattas här.

Hösten och vintern var mild fram till mitten av januari. Då skedde ett väderomslag med en cirka tre veckor lång köldperiod. I västra Skåne utvintrade en hel del arealer och även vissa av våra försök t.ex. försöken med bekämpning av renkavle.

Mot åkerven och örtogräs (L5-2424) genomfördes i höstvetete två försök. Försöken redovisas enskilt eftersom förutsättningarna var olika på alla försöksplatserna. I försöket på Hellegården fanns det lite gräsogräs dock fanns det rikligt med snärjmåra. Skördeökningen var ganska måttlig och inte signifikant. Hög skörd och högst ogräseffekt hade bekämpning med 0,3 l Bacara på hösten kompletterat med 110 g Broadway + 0,5 l PG26N på våren. Försöket i Vassmolösa hade måttligt med åkerven och ganska lite örtogräs. Skördeökningen var också här måttlig och inte signifikant. Hög skördeökning och högst ogräseffekt blev det efter en höstbehandling med 0,5 l Bacara följt upp på våren med 100 g Hussar + 0,5 l Renol.

I försöksserien bekämpning av losta i höstvetete (L5-2426) utfördes två försök. I försöket i Skurup fanns det rikligt med sandlosta och snärjmåra. Högst skörd och högst effekt på sandlosta hade en dubbelbehandling med 12,5 g Monitor + 0,5 l vätmedel på våren. Skördeökningen var

signifikant och blev som mest 1 850 kg/ha. I försöket på Hellegården fanns det rikligt med vallmo, en del åkerven och ganska lite sandlosta. Högst skörd och högst ogräseffekt hade en dubbelbehandling på våren med 110 g Broadway + 0,5 l PG26N. Även här var skördeökningen signifikant och blev som mest 4 790 kg/ha.

Mot vitgröe i höstvetete utfördes ett försök (L5-2427). I försöket förekom det vitgröe, raps och viol i måttliga mängder. Högst skörd och hög ogräseffekt hade en behandling med 1,5 l Boxer + 0,25 l Baccara på hösten kompletterat med 2 tabletter Harmony Plus + 0,1 l vätmedel på våren. Signifikanta skördeökningar blev det som mest med 880 kg/ha.

Mot örtogräs i allmänhet i höstvetete genomfördes ett försök (L5-3021). Lomme, veronika och viol dominerade, men även vitgröe fanns. Skördeökningen var signifikant och blev som mest 840 kg/ha. Bästa behandling var 1,5 l Boxer + 0,1 l Legacy på hösten följt upp med 11,25 g Express + 0,6 l Tomahawk på våren.

Mot vallmo och örtogräs i höstvetete utfördes ett försök (L5-3024). Ogräsfloran bestod av våtarv, raps och en del vallmo. Högst skörd och bäst ogräseffekt hade en kombinerad behandling med 0,3 l Bacara på hösten och 1,0 l Mustang Forte på våren. Skördeökningen var signifikant och blev som mest 2 290 kg/ha.

I vårkorn genomfördes fyra försök med lite olika inriktning. Bekämpning av då (L5-401), ett försök med rikligt med då och våtarv samt vitgröe. Skördeökningen var signifikant och uppgick som mest med 2 050 kg/ha. Hög skörd och bäst ogräseffekt hade en behandling med 22,5 g CDQ + 0,4 l Starane + 0,1 l vätmedel. I försöket fanns det rikligt med våtarv. Effekten var svag när sulfonylureor användes utan blandningspartner. Mot näva och örtogräs genomfördes två försök. Försöken dominerades av målla och näva i måttliga mängder. Högst skörd och bäst ogräseffekt hade 22,5 g CDQ + 0,4 l Starane + 0,1 l vätmedel. Skördeökningen var måttlig och inte signifikant.

I majs utfördes tre försök (L5-840). Skördeökningen var signifikant och blev mycket hög, 7,7–10,1 ton ts/ha i genomsnitt. Dominerande ogräs var målla, nattskatta, pilört och veronika. Högst skörd och hög ogräseffekt hade en tvådelad strategi med 0,5 l Callisto + 11,25 g Harmony + 0,2 l vätmedel på små ogräs följt av 0,5 l Callisto + 50 g MaisTer + 0,67 l MaisOil 10–12 dagar senare. I försöket ingick också en tredelad strategi. Det verkar dock inte vara lönsamt att behandla en tredje gång även om effekten på ogräs är marginellt bättre med denna strategi.

För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att anpassa till de lokala förhållandena som råder. De finns många goda alternativ att välja på.

## Försök 2012

*Ogräsförsöken finansieras genom att varje företag anmäler och betalar för sina led. Ett stort tack till våra finansörer! Resultaten från de enskilda försöken med statistik kan hämtas på Fältforskningsenhetens och Skåneförsökens hemsida <http://www.slu.se/faltforsk> och <http://www.skaneforsoken.nu/>.*

# Aktuellt försök >>

## Vitgröe och örtogräs i höstvetete L5-2427 höst och vår

### **ALLMÄNT OM FÖRSÖKEN**

Endast ett försök utfördes i Sandby gård (LB-261-2011) i södra Sverige.

### **FÖRSÖK SANDBY GÅRD**

Försöket såddes den 16 september. Höstbekämpningen vid grödans 1,5-bladstadium utfördes enligt plan den 2 oktober. Behandlingen på våren vid tillväxtens början utfördes den 12 april.

Behandlingarna har i genomsnitt gett upphov till måttliga signifikanta skördeökningar på som mest på 880 kg/ha (tabell 5). Högst skörd hade led F, 1,5 l Boxer på hösten kompletterat med 2 tabletter Harmony Plus med 0,1 l vätningsmedel på våren. I försöket förekom det en del vitgröe och raps samt viol. Bäst effekt på vitgröe hade 1,5 l Cougar på hösten.

Tabell 5. L5-2427

Bekämpning av vitgröe och örtogräs, skörd och ogräsvikt relativt, försök Sandby gård, Borrby (LB-261-2011)

Försöksled	Skörd ton/ha	Skörd relativt	Vitgröe g/m <sup>2</sup>	S:a örtogräs g/m <sup>2</sup>
A. Obehandlat, skörd ton/ha ogräs g/m <sup>2</sup>	11,65		127	350
A. Obehandlat. Relativt		100	100	100
B. 1,25 l Bacara <sup>1)</sup> Mätare	12,35	106	7	1
C. 1,5 l Cougar <sup>1)</sup>	12,29	105	0	1
D. 0,5 l Bacara + 0,5 l Atlantis OD <sup>1)</sup>	12,38	106	4	1
E. 0,25 l Bacara + 1,0 l Boxer <sup>1)</sup> o 100 g Hussar + 0,5 Renol <sup>2)</sup>	12,40	106	1	0
F. 0,25 l Bacara + 1,5 l Boxer <sup>1)</sup> o 2 tab Harmony Plus + 0,1 vtm <sup>2)</sup>	12,53	107	9	1
G. 0,25 l Cougar + 1,5 l Boxer <sup>1)</sup> o 2 tab Harmony Plus + 0,1 vtm <sup>2)</sup>	12,43	107	1	1
H. 2,0 l Boxer + 0,1 l Legacy <sup>1)</sup> o 11,25 g Express SX + 0,1 l vtm <sup>2)</sup>	12,24	105	2	0
I. 0,5 l Bacara <sup>1)</sup> o 150 g Hussar + 0,5 Renol <sup>2)</sup>	12,29	105	8	0
J. 100 g Hussar + 0,6 l Atlantis OD + 0,5 l Renol <sup>2)</sup>	12,1	104	6	19
Variationskoefficient (%):	1,3			
Signifikans:	***			
LSD 5 %:	0,22			

<sup>1)</sup> Höst, grödan 1,5 blad, <sup>2)</sup> Vår, tillväxtens början