

L9-1070. Strategi mot rost i höstvet i Sydsvetige. Tre försök

Försöksvärdar:

Svedberga Lantbruks AB, Ödåkra

Sort:

Kranich

Nils Lundberg, Tingaröds boställe, Skivarp

Cumulus

Per-Olof Tidala, Hoby, Borrbby

Cumulus

i försöket i Borrbby ökade långsammare och blev mindre. I försöket (Svedberga) som låg i sorten Kranich utvecklades angreppen ganska långsamt och slutangreppen blev där endast måttliga. Alla strategierna innefattade tre bekämpningar och effekten mot gulrost var god i samtliga led. Lön-samheten var god för alla bekämpningarna.

Syftet med försöken var att studera olika behandlingsstrategier mot gulrost och försöken lades därför ut i sorterna Cumulus och Kranich. Redan vid första behandlingen i slutet av april fanns etablerade angrepp av gulrost i de skånska försöken. Angreppen utvecklades mycket kraftigt i sorten Cumulus, speciellt i försöket i Skivarp, medan de

Tabell 7. Höstvet, L9-1070. Skörd och merskörd (kg/ha) och netto-merintäkt (kr/ha). Tre försök 2014

Led	Behandling	Dos (kg, l/ha) vid DC			Skörd och merskörd, (kg/ha)			Medel 3 f Skåne	
		30-31	37-39	55-59	Svedberga Kranich	Skivarp Cumulus	Borrbby Cumulus	Skörd kg/ha rel/ha	Nettomer-intäkt kr/ha rel tal
1	Obehandlat				100 b (=8 610)	100 b (=5 800)	100 b (=6 000)	100 b (=6 800)	100
2	Fl + Tilt + F & P + CP + Sp & P	0,25 + 0,125 + 0,125	0,4 + 0,3 + 0,5	0,4	110 a	196 a	141 a	144 a	125
3	St + Fl + F & P + CP & P + CP	0,5+0,25+0,5	0,3 + 0,3	0,4 + 0,3	114 a	199 a	143 a	147 a	127
4	St + Fl + F & P + CP & P + CP	0,5+0,25+0,5	0,3 + 0,6	0,4 + 0,6	114 a	198 a	142 a	146 a	123
5	Tern + Bu & Folpan + P & P + CP	0,25+0,25	1,0 + 0,2	0,4 + 0,3	111 a	199 a	139 a	144 a	
6	T + F & P + CP & Ar	0,125+0,125	0,4 + 0,3	0,4	113 a	197 a	142 a	145 a	131
7	T & P + CP & Ar	0,25	0,4 + 0,3	0,4	113 a	194 a	141 a	144 a	129



*Flygfoto från multicopter över L9-1070.
Försöksplats Nils Lundberg, Tingaröds boställe, Skivarp*