



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

L3-0010

M-591-1951

03F075

1

Växtföljd och skörderester

Peter Bager
Petersborg, 230 42 Tygelsjö

GRÖDA: Vall I Höstrapså
SORT: Calypso
DATUM: 2004-09-13
FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 6,9

P-AL: 10,0

K-AL: 6,0

Mg-AL:

Ca-AL:

P-HCl:

K-HCl: 120

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

5 28 64 52

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	FRÖ	REL-	AV-	VATT.	RÅ-	N	PLANT	STRÅ-	TS	TS-	N	SLU-	BALJV	GRÄS	ÖVR.
	RENV.	TAL	RENS-	HALT	FETT	%	TÄT-	STYR-	KG/HA	HALT	% AV	TENH.	GRAD	GRAD	GRAD
	15%		%	VID	%	AV TS	HET	KA	SK. 1	%	TS	VÅR	SK. 1	SK. 1	SK. 1
	KG/HA			SKÖRD		HALM	0-100	0-100	07-19	SK. 1	SK.1	0-100	0-100	0-100	0-100
	08-03						04-07	08-03				04-07	07-09	07-09	07-19
A. UTAN HALM OCH BLAST									8830	35,2	1,20	80	34	60	6
B. HALMEN BRÄNNES-BLASTEN BORTFÖRES	3240	100	2,8	8,9	49,3	0,70	86	96							
C. HALMEN OCH BLASTEN NEDPLÖJES	3190	99	4,2	10,6	48,1	0,70	88	96							
-X-	3210								8830						
CV%	4,1								10,9						
OBS	8								4						
PROB F1	.6408														

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2006-01-03